

Курильских островов (Парин и др., 1995). Пелагический. Длина до 16 см.

#### Семейство COREGONIDAE

##### Род *Coregonus* Lacépède, 1804

*C. anaulorum* Kaganowsky, 1933 — Сиг-востряк. Полупроходной. Встречается в зал. Шелихова в Охотском море и Анадырском заливе в Беринговом море (Черешнев, 1996). Длина 51,7 см. Промысловый.

*C. laurettae* Bean, 1882 — Берингоморский омуль. Полупроходной вид западного побережья Аляски, встречается на восточной оконечности Чукотского полуострова (Черешнев, 1996).

*C. lavaretus pidschian* (Gmelin, 1788) — Сиг-пыжьян, сибирский сиг. Полупроходной, реже жилой, имеет много экологических форм. Распространен в бассейне Северного Ледовитого океана, встречается в северо-западной части Берингова моря от р. Хатырка до Анадырского залива, в Охотском море в бассейне р. Пенжина (Черешнев, 1996).

*C. nasus* (Pallas, 1776) — Чир. Полупроходной. Распространен во всех реках бассейна Северного Ледовитого океана, встречается в Анадырском заливе Берингова моря и реках восточного побережья Пенжинской губы Охотского моря (Решетников, 1980; Черешнев, 1996). Длина до 60 см и более.

*C. sardinella* Valenciennes, 1848 — Сибирская ряпушка. Преимущественно речной и озерный вид, но встречаются и полупроходные формы. Распространен от р. Кары на западе до Берингова моря и Аляски (Решетников, 1980; Черешнев, 1996). Длина до 42 см.

*C. subautumnalis* Kaganowsky, 1932 — Пенжинский омуль. Полупроходной и жилой. Реки Пенжинской губы Охотского моря (Черешнев, 1996). Длина до 43,3 см. Промысловый.

*C. ussuriensis* Berg, 1906 — Уссурийский (амурский) сиг. Эндемик амурского бассейна. Жилой и полупроходной. Встречается в северной части Татарского пролива у северо-западного побережья Сахалина и в Амурском лимане (Шмидт, 1950; Решетников, 1980). Длина до 60 см.

##### Род *Stenodus* Richardson, 1836

*S. leucichthys nelma* (Pallas, 1773) — Нельма. Полупроходной, реже жилой. Населяет все реки Северного Ледовитого океана от Белого моря до Анадыря, Юкона и Маккензи, встречается в реках Наяхан и Охота на побережье Охотского моря (Решетников, 1980; Черешнев, 1996). Длина до 150 см. Промысловый.

#### Семейство PLECOGLOSSIDAE

##### Род *Plecoglossus* Temminck et Schlegel, 1846

*P. altivelis* Temminck et Schlegel, 1846 — Аю. Проходной. Южная часть Японского и Желтого моря, на юг до о. Тайвань (Линдберг, Лезега, 1965). Длина до 20 см. Промысловый.

#### Семейство SALMONIDAE

##### Род *Oncorhynchus* Suckley, 1861

*O. gorbuscha* (Walbaum, 1792) — Горбуша. Проходной. Входит в реки России от Берингова пролива до зал. Петра Великого в Японском море, вдоль американского побережья до Калифорнии (Groot, Margolis, 1991). Длина до 76 см и масса до 5,5 кг. Промысловый.

*O. keta* (Walbaum, 1792) — Кета. Проходной. Входит в российские реки от Лены до Туманной в зал. Петра Великого в Японском море, вдоль американского побережья на юг до Калифорнии (Groot, Margolis, 1991). Длина до 102 см, масса до 15 кг. Промысловый.

*O. kisutch* (Walbaum, 1792) — Кижуч. Проходной. В реки азиатского побережья входит от Анадыря до южного побережья Хоккайдо, Командорских и Шантарских островов, охотского побережья и Сахалина (Groot, Margolis, 1991). Длина до 98 см и масса до 14 кг. Промысловый.

*O. masou* (Brevoort, 1856) — Сима. Проходной и пресноводный. Распространен только у азиатского побережья от западных и восточных берегов Камчатки до Желтого моря (Groot, Margolis, 1991). Длина до 70 см. Промысловый.

*O. nerka* (Walbaum, 1792) — Нерка. Проходной, в озерах образует жилые формы. У азиатского побережья от Анадыря до тихоокеанского побережья Хонсю, у американского от Аляски до Калифорнии (Groot, Margolis, 1991). Длина до 84 см. Промысловый.

*O. tshawytscha* (Walbaum, 1792) — Чавыча. Проходной. Распространен в северной части Тихого океана от Анадыря до Амура, Хоккайдо и Калифорнии (Groot, Margolis, 1991). Длина до 147 см и масса до 61,2 кг. Промысловый.

##### Род *Parahucho* Vladikov, 1963

*P. perryi* (Brevoort, 1856) — Сахалинский таймень. Редкий проходной вид. Входит в реки Хоккайдо, Сахалина и Приморья (Решетников и др., 1997). Длина до 89 см.

##### Род *Parasalmo* Vladikov, 1972

*P. gaidneri* (Richardson, 1836) — Стальноголовый лосось. Проходной, реже жилые формы. Интродуцирован по всему миру. От