

Класс Костные рыбы – *Osteichthyes*
Отряд Лососеобразные – *Salmoniformes*
Семейство Лососевые – *Salmonidae*



50

Таймень сибирский
из р. Комиссаровки

Таймень сибирский

Hucho taimen (Pallas, 1773)

Тело низкое, удлинённое, покрытое мелкой чешуей. Голова слегка сплюснута сверху вниз, рот очень большой. На боках тела, выше и ниже боковой линии, 8-10 темных поперечных полос и обычно темные X-образные и полукруглые пятнышки. D III-V 9-11; A III-IV (V) 8-10; GR 11-12; Vert. 68-71.

Крупная рыба, достигающая длины 150 см и массы 60-80 кг. Таймень предпочитает быстрые горные и таежные реки, обитает в чистых холодноводных озерах. Половозрелым становится на 4-6-м годах жизни. Икру мечет в мае в мелких протоках, на галечном грунте. Плодовитость 10-34 тыс. икринок. Икру откладывает в гнезда. Во время нереста тело становится медно-красным. После нереста, а также осенью и зимой интенсивно питается. Типичный хищник, в пище которого доминирует мелкая рыба. Летом держится в небольших протоках, к осени спускается в русла крупных рек и озер. В море никогда не выходит.

Пресноводный вид. В Приморье встречается в бассейне р. Уссури и оз. Ханка, а также в других реках и озерах бассейна Амура. Широко представлен в реках и крупных озерах Сибири и европейской части России – до Печоры и верховьев Волги.

Желанная добыча рыбака-любителя. Обладает жирным, вкусным мясом. Используется в соленом, а также в свежем, мороженом или копченом видах, но из-за малой численности занесен в Красную книгу Российской Федерации.

51

Класс Костные рыбы – *Osteichthyes*
Отряд Лососеобразные – *Salmoniformes*
Семейство Лососевые – *Salmonidae*



Таймень сахалинский
из р. Серебрянки

Таймень сахалинский *Parahucho perryi* (Brevoort, 1856)

Сахалинский таймень (*Parahucho perryi*) – проходная рыба. Он встречается во многих водоемах бассейна Японского моря, на о-вах Сахалине и Хоккайдо, в Корее и Приморье. Местные названия – таймень, чевица или гой. Эта серебристая рыба с крупными черными пятнами по всему телу имеет крупную голову, большой конечный рот с мощными зубами. В море окраска серебристая. Во время нереста приобретает малиновый оттенок. Вес его до 30-50 и более килограммов.

D III 9-10; A III 8-10; GR 12-14.

Подобно другим проходным лососевым, сахалинский таймень нерестится в пресной воде на перекатах в мае-начале июня при температуре воды около 12-16 °С в русле реки с большой скоростью течения. Как и другие лососевые, икру желтого цвета откладывает в песчано-гравийный субстрат. Здесь же развиваются мальки и молодь до массы около 100 г. Отнерестовавшие производители уходят в море для нагула, в августе-октябре возвращаются обратно в эстуарии рек. В больших реках с обильным кормом можно и летом встретить крупных рыб. Таймени – хищники, питающиеся в основном крупной рыбой, но могут поедать также водоплавающих птиц и млекопитающих. В реках Приморья во время зимовки в устье реки питаются миногой, заходящей на нерест в эти же сроки.

Сахалинский таймень обладает прекрасными вкусовыми качествами, поэтому является любимым объектом спортивного и любительского рыболовства. В последние годы численность этого вида в некоторых реках Приморья резко сократилась, поэтому он занесен в Красную книгу Приморского края.