

Р о д 16. HUCHO Günther, 1866 – таймени

42. *Hucho taimen* (Pallas, 1773) – обыкновенный таймень.

- Salmo taimen* Pallas, 1773: 216 (р. Тура): 716 (реки Сибири).
Salmo fluviatilis – Pallas, 1814: 359 (Обь, Енисей, Лена, Байкал, Кама).
Salvelinus (Hucho) taimen – Берг, 1909: 40 (Кама, Иртыш, Енисей и др.).
Hucho taimen – Берг, 1916: 70 (низовья Оби); Берг, 1948: 296.
Hucho hucho taimen – Holčík et al., 1988: 10.

Населяет все реки Сибири (есть в озерах норильских, Зайсане, Телецком, Байкале); на восток до Индигирки (в Колыме нет), есть в бассейне Амура. На западе доходит до бассейнов Камы и Вятки, имеется в притоках Средней Волги, в бассейне Верхнего Урала. В верховьях Печоры встречается редко (р. Ылыч), найден между Обью и Печорой. В бассейне Дуная живет близкородственный вид *H. hucho* (Linnaeus, 1758). Некоторые авторы рассматривают *H. taimen* в ка-

31

честве подвида *H. hucho* (Holčík et al., 1988). Редкий и нуждающийся в охране вид, популяции европейской части предлагаются для занесения в "Красную книгу России".

Р о д 18. PARAHUCHO Vladukov, 1963 – сахалинские таймени

49. *Parahucho perryi* (Brevoort, 1856) – сахалинский таймень.

- Salmo perryi* Brevoort, 1856: 273 (Хакодате).
Oncorhynchus orientalis (поп Pallas) – Никольский, 1889: 303 (Сахалин).
Hucho blackistoni – Шмидт, 1904: 286 (Владивосток, Сахалин).
Hucho perryi – Берг, 1916: 72; Берг, 1948: 299.
Parachucho perryi – Глубоковский, 1990: 17.

Проходной вид. Из Японского моря входит в реки Хоккайдо, Сахалина и Приморья. Был выделен в самостоятельный подрод *Parahucho* (Vladukov, 1963), а затем и в род (Глубоковский, 1990). Отличается от *Hucho* рядом морфологических (Шапошникова, 1968) и кариологических (Анбиндер и др., 1982) признаков. Локальный эндемичный вид с сокращающейся численностью. Намечен к занесению в "Красную книгу России". Объект местного лова.